

- En période de permanence de soins (PPS), seuls les examens mentionnés dans ce document seront réalisés et diffusés.
- Hors PPS, seuls les résultats des examens URGENTS sont diffusés après validation technique.
- Période de permanence de soins (PPS) : jours ouvrés du lundi au vendredi de 16h à 7h, samedi de 12h à lundi 7h, jours fériés.

Famille	Nom de l'examen	Délai maximum de communication des résultats (= délai entre prélèvement et validation technique de l'examen)
<b>Examens sanguins ou LCR</b>		
Hématocytologie	Numération Formule, Recherche de schizocytes	6H, 2H si urgence pour la numération sanguine ; Jusqu'à 48H si vérification de la formule sur frottis coloré au MGG
	Paludisme	2H
Immuno-hématologie	Groupe sanguin, Coombs direct	6H, 2H si urgence
	RAI	6H, 2H si urgence ; en cas de positivité prévoir jusqu'à 3 jours supplémentaires
Hémostase	TP, INR, TCA, Fibrinogène, D-Dimères	6H, 2H si urgence
Biochimie standard	Na, K, Ca - Ca corrigé, Osmolarité calculée, Urée, Créatinine, Acide urique, Bilirubine totale, Bilirubine conjuguée, Albumine	6H, 2H si urgence
	Protéines totales, Glucose, Cl	6H (sang), 2h (LCR)
Enzymologie	TGO, TGP, CK, LDH, GGT, Lipase	6H, 2H si urgence
Marqueurs cardiaques	Troponine Ths, Myoglobine, NT-Pro BNP	6H, 2H si urgence
Protéines spécifiques	CRP Haptoglobine	6H, 2H si urgence
Biochimie divers	Ammoniémie, Ethanol, Procalcitonine	6H, 2H si urgence
	Acide lactique	4H (sang), 2H (LCR)
Gazométrie	Gaz du sang, Méthémoglobine, Calcium ionisé, HbCO	Sans délai
Hormonologie	TSH, Bêta-HcG	6H, 2H si urgence
Toxiques sanguins	Antidépresseurs tricycliques, Benzodiazépines, Paracétamol, Phénobarbital, Salicylés	6H, 2H si urgence
Médicaments	Carbamazépine	6H
	Acide valproïque, Digoxine, Lithium	6H, 2H si urgence
Sérologies AES	HIV, HVC, Ag HBS	6H, 4H dans le cadre d'un AES
Sérologie	Mycoplasma pneumoniae	8H
<b>Examens urinaires</b>		
Biochimie	Na, K, Protéines, Microalbumine, Osmolarité calculée, Urée, Glucose, Créatinine	6H
Drogues	Cannabis, Cocaïne, Opiacés, Amphétamines, Métamphétamines, Buprénorphine, Ecstasy, Méthadone, Benzodiazépines, Antidépresseurs tricycliques	6H (test qualitatif)
<b>Examens microbiologiques</b>		
Hémocultures		5 jours à 37°C Incubation prolongée jusqu'à 15j si recherche particulière de brucellose, suspicion endocardite
LCR		Cytologie 2H, culture minimum J2 et maximum J5
Liquide de ponction		Cytologie 8H, culture minimum J2 et maximum J10 (J15 pour liquide articulaire)
Prélèvements mère-enfant si suspicion d'infection (liquide gastrique du NN, placenta, membrane amniotique du NN, cordon ombilical du NN, prélèvements périphériques du NN)		Minimum J2 et maximum J4
ECBU si suspicion de pyélonéphrite		Minimum J1 et maximum J5
Pus de suppurations profondes		Minimum J2 et maximum J10
Pus de suppurations oculaires		Minimum J2 et maximum J7
Ag solubles urinaires de Legionella pneumophila		8H
Ag de Clostridium difficile (selles épousant la forme du contenant)		8H (GDH)
Recherche de VRS		8H
Recherche de Rotavirus et d'Adénovirus dans les selles		8H
Recherche de sperme dans le cadre d'un attentat à la pudeur		2H